


# Avertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
RHÔNE-ALPES

## Arboriculture

165, rue Garibaldi - Bâtiment B - B.P. 3202 - 69401 LYON Cédex 03

☎ 78.63.25.65

ABONNEMENT ANNUEL : 150 F - Régisseur Recettes DRAF Rhône-Alpes

Bulletin n° 7 - 11 Avril 1989


**Acariens rouges** : Début des éclosions - Ne plus utiliser l'APOLLO  
**Tavelures du pommier et du poirier** : Les risques de projections sont importants  
**Moniliose du cerisier** : protégez vos plantations durant la chute des pétales  
Tableau des produits de traitement anti-tavelures p. 4

### TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Lors de chaque pluie, des spores sont projetées sur le feuillage et en présence d'eau elles germent et pénètrent dans les feuilles.

Actuellement, il est nécessaire de maintenir une protection préventive. Les produits curatifs seront utilisés après des périodes pluvieuses plus longues (2 à 3 jours de pluie continue).

#### Positionnement d'un traitement curatif dans un contexte de lutte préventive



▲ jour du traitement

### PUCERONS - CHENILLES DEFOLIATRICES SUR POMMIERS ET POIRIERS

Si vous n'êtes pas intervenu avant la floraison, appliquez un traitement à la chute des pétales.

### MONILIOSE DU PECHER

En Savoie et en Haute-Savoie où le stade G est atteint appliquez un fongicide avant la fin de cette semaine.

Produits utilisables : cf. moniliose du cerisier.

7646

## **OIDIUM DU PECHER**

Le fruit est sensible à l'oïdium dès le stade H (fruit noué), intervenez dès cette semaine et maintenez une cadence de 10 à 12 jours dans les vergers où le risque est important.

Produits utilisables :

bupirimate	: 15 g de ma/hl	NIMROD
chinométhionate	: 7,5 g de ma/hl	MORESTAN
dinocap	: 18,25 g de ma/hl	KARATHANE
fenarimol	: 4 g de ma/hl	RUBIGAN 4
penconazole	: 3,5 g de ma/hl	TOPAZE
pyrazophos	: 30 g de ma/hl	AFUGAN CE
triforine	: 33,25 g de ma/hl	Nombreuses spécialités
soufre	: 600 g de soufre micronisé	Nombreuses spécialités

## **MONILIOSE DU CERISIER**

Les conditions climatiques de ces derniers jours ont été favorables au développement de cette maladie, aussi il est nécessaire d'appliquer un fongicide cette semaine.

Produits utilisables :

- \* Groupe des benzimidazoles
  - bénomyl : 30 g de ma/hl (BENLATE)
  - thiophanate méthyl : 70 g de ma/hl (PELT)
  - carbendazime : 30 g de ma/hl (Nombreuses spécialités)
- \* Autres fongicides
  - bitertanol : 30 g de ma/hl (BAYCOR 300 EC)
  - iprodione : 75 g de ma/hl (KIDAN - ROVRAL)
  - procymidone : 75 g de ma/hl (SUMISCLEX)
  - thirame : 200 g de ma/hl (Nombreuses spécialités) efficace pour lutter contre le Corynéum
  - triadiménol : 10 g de ma/hl (BAYTAN 5 liquide)
  - triforine : 33,5 g de ma/hl (SAPROL - DENARIN - FUNGINEX)
  - vinchlozoline : 50 g de ma/hl (RONILAN)

## **PUCERONS - CHENILLES DEFOLIATRICES SUR CERISIERS, ABRICOTIERS**

Observez régulièrement vos plantations afin de déceler la présence éventuelle de ces parasites. En présence de dégâts (feuilles rongées - chenilles - ou feuilles enroulées - pucerons) intervenez avec l'un des produits suivants :

acéphate	: ORTHENE
alphaméthrine	: FASTAC
azinphos méthyl + déméton-s-méthyl sulfone	: GUSATHION MS
cyperméthrine	: nombreuses spécialités
deltaméthrine	: DECIS
esfenvalérate	: SUMI-ALPHA
éthiophencarbe	: CRONETON
fenvalérate	: SUMICIDIN
fluvalinate	: KLARTAN
lindane	: nombreuses spécialités
métamidophos	: TAMARON - ORTHOTOX
phosalone	: ZOLONE
perméthrine	: AMBUSH
pyrimicarbe	: PRIMOR G uniquement aphicide

## **TOUS ARBRES FRUITIERS**

### **ACARIENS ROUGES**

Dans le Sud de la région (Bas-Vivarais et Sud de la Drôme) 60 à 80 % des oeufs ont éclos.

Dans les secteurs suivants : Isère (Beaurepaire, Jarcieu...) ; Nord de la Drôme (St Sorlin...) ; Loire (Chavanay, Maclas...) ; Ain (Flaxieu) ; Rhône (Charly, St Didier...), les éclosions ont débuté entre le 30 Mars et le 04 Avril.

En Savoie (La Motte Servolex, Verrens Arvey...) et en Haute-Savoie (Rumilly...) les premières larves ont été observées le 07 Avril.

Quel que soit votre secteur, ne plus appliquer APOLLO.

Pour le Sud de la région, si vous utilisez du César, intervenez avant la fin de cette semaine.

Pour l'Isère, le Nord de la Drôme, la Loire, l'Ain et le Rhône, si vous utilisez du Crototex ou Karedas appliquez cet acaricide cette semaine. Pour le César, n'intervenez pas avant le 20 Avril.

Dans les Savoies l'utilisation du Crototex ou Karedas s'effectuera à partir du 17 Avril ; pour l'application du César attendre un prochain Bulletin.

### **XYLEBORES**

Les conditions climatiques actuelles sont défavorables à l'activité des adultes ; aussi il n'est pas nécessaire d'intervenir pour le moment.



## Les produits de traitements anti-tavelures

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose de spécialité par hectare (1000 l/ha)	Délai d'utilisation « stop » ou « curatif » à partir du début de la pluie contaminatrice	Durée d'action préventive (en jours)	Autorisation sur oïdium du pommier	Action secondaire vis-à-vis de la rugosité sur Golden
------------------	--------------------------	--	--	--------------------------------------	------------------------------------	---

### PRODUITS DE CONTACT (TRAITEMENT PRÉVENTIF OU STOP)

Par rapport à un témoin non traité

<i>captane</i>	Nombreuses spécialités	1,5 kg m.a.	24 heures	7	—	Freine parfois
<i>cuivre</i>	Nombreuses spécialités	2,5 kg m.a.	•	7	—	Favorise
<i>folpel</i>	Nombreuses spécialités	1 kg m.a.	24 heures	7	—	•
<i>mancozèbe</i>	Nombreuses spécialités	1,6 kg m.a.	24 heures	7	—	Neutre
<i>manèbe</i>	Nombreuses spécialités	1,6 kg m.a.	24 heures	7	—	•
<i>oxyquinoléate de cuivre</i>	Quinolate 400	2 l	•	7	—	•
<i>propinèbe</i>	Antracol	3 kg	24 heures	7	—	•
<i>soufre micronisé</i>	Nombreuses spécialités	6 kg	•	4 à 5	oui	Freine
<i>thirame</i>	Nombreuses spécialités	2 kg m.a.	24 heures	7	—	Freine parfois
<i>zinèbe</i>	Nombreuses spécialités	2 kg m.a.	24 heures	4 à 5	—	Neutre
<i>zirame</i>	Nombreuses spécialités	1,8 kg m.a.	24 heures	4 à 5	—	Renseignements contradictoires
<i>dithianon</i>	Delan 750 F	0,7 l	32 heures	7	—	•
<i>doguadine</i>	Melprex	0,75 kg	36 heures	7	—	Favorise parfois
<i>tolyfluamide</i>	Méthyleuparène	1,5 kg	48 heures	7	—	•

### PRODUITS À BASE D'INHIBITEURS DE STÉROLS, PÉNÉTRANTS OU SYSTÉMIQUES ET ASSOCIATIONS PÉNÉTRANTS + CONTACTS (TRAITEMENT PRÉVENTIF, STOP OU CURATIF)

Par rapport au captane

<i>triforine</i>	Nombreuses spécialités	2 l	3 jours	3	oui	Favorise parfois
<i>bitertanol</i>	Baycor 25	0,75 kg	4 jours	3	—	Favorise parfois
<i>fénarimol</i>	Rubigan 4*	1 l	4 jours	3	oui	Favorise parfois
<i>flusilazol</i>	Nustar 40 EC	0,05 l	5 jours	4	oui	Favorise parfois
<i>fénarimol + mancozèbe + captane</i>	Erisan Super*	2 kg	4 jours	3	—	Neutre
<i>nuarimol + captane</i>	Prévalan	1 kg	4 jours	3	—	Neutre
<i>nuarimol + mancozèbe</i>	Sporlan, Spontal	2 kg	4 jours	3	—	Neutre
<i>penconazole + captane</i>	Topaze C*	1 kg	4 jours	3	oui	Neutre
<i>pyrifénol + captane</i>	Rondo	1 kg	5 jours	3	oui	Neutre
<i>mancozèbe + pyrifénol</i>	Rondo M**	1,5 kg	5 jours	3	oui	•
<i>captane + mydobutanil</i>	Systhane C**	1,25 kg	•	•	oui	•

m.a. matière active

• manque de références

\* spécialité commerciale non autorisée ou non recommandée contre la tavelure du poirier

\*\* autorisation de vente récente (fin 88)

#### Remarques :

- en conditions difficiles (fort inoculum, températures élevées) réduire d'un jour les durées d'utilisation en curatif
- les nombreuses associations entre produits de contact n'ont pas été incluses dans ce tableau